

Ann-Arbor Klassifikation für maligne Lymphome

- Stadium I:** Befall einer einzigen Lymphknotenregion (I/N)
oder-
Vorliegen eines einzigen lokalisierten extranodalen Herdes (I/E)
- Stadium II:** Befall von 2 oder mehr Lymphknotenregionen auf einer Seite des Zwerchfells (II/N)
oder
Vorliegen lokalisierter extranodaler Herde mit Befall einer oder mehrerer Lymphknotenregionen auf einer Seite des Zwerchfells (II/E)
- Stadium III:** Befall von 2 oder mehr Lymphknotenregionen auf beiden Seiten des Zwerchfells (III/N)
oder-
Befall von lokalisierten extranodalen Herden und Befall einer oder mehrerer Lymphknotenregionen, so daß ein Befall auf beiden Seiten des Zwerchfells vorliegt (III/E)
- Stadium III 1:** subphrenische Lokalisation, beschränkt auf Milz, zöliakale und/oder portale Lymphknoten allein oder gemeinsam (Befall oberhalb des Truncus coeliacus)
- Stadium III 2:** subphrenische Lokalisation mit Beteiligung paraaortaler, mesenterialer, iliakaler und/oder inguinaler Lymphknoten allein oder gemeinsam (Befall unterhalb des Truncus coeliacus)
- Stadium IV:** Disseminierter Befall eines oder mehrerer extralymphatischer Organe mit oder ohne Befall von Lymphknoten·
(Eine Beteiligung des Knochenmarkes oder der Leber gilt grundsätzlich als Stadium IV)

Die Stadien I - IV erhalten den Zusatz B, wenn ein oder mehrere der folgenden Allgemeinsymptome vorliegen, und den Zusatz A, falls diese fehlen.

Allgemeinsymptome sind:

nicht erklärbares Fieber über 38C°

nicht erklärbarer Nachtschweiß

nicht erklärbarer Gewichtsverlust von mehr als 10% des Körpergewichts innerhalb von 6 Monaten

N = Lymphknoten

E = extranodal